

Объединенный календарь вакцинации: для детей и взрослых

Национальный календарь	
	Все лица данной возрастной группы
	Лица из групп риска, по показаниям, призывники
	Ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений и однократно привитые (для кори и краснухи)
V1, V2, V3	Порядковый номер вакцинации
RV	Ревакцинация
ИПВ	Инактивированная полиомиелитная вакцина
ОПВ	Оральная полиомиелитная вакцина
По эпидемическим показаниям	
	Лица, проживающие на эндемичных территориях; лица, выезжающие на эндемичные территории; лица, подверженные профессиональному риску заражения
	Лица в очагах инфекции, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу
	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических и прививках
	Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые
	Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротовирусами
*	Схема согласно действующим инструкциям по медицинскому применению препарата
**	Возраст начала вакцинации и схема введения в зависимости от выбранного препарата
Региональная программа СПб «Борьба с онкологическими заболеваниями», 2019–2024 годы	
	Все лица данной возрастной группы

- Если вакцинация начинается в 2–6 месяцев, то индивидуальная иммунизация проходит по схеме 3+1, массовая иммунизация — по схеме 2+1 (представлена в таблице).
 - Если вакцинация начинается в 7–11 месяцев, то иммунизация проходит по схеме 2+1: 2 дозы с интервалом не менее 4 недель между введениями. Ревакцинация однократно в 2 года.
 - Если вакцинация начинается в 12–23 месяца, то иммунизация проходит по схеме 1+1: 2 дозы с интервалом не менее 8 недель между введениями.
 - Если вакцинация начинается в 2 года или старше, то иммунизация проходит однократно.
- V1 и V2 независимо от возраста проводятся только ИПВ, V3 и последующие дозы могут быть как ИПВ, так и ОПВ.
- Если ребенка начали прививать до 6 месяцев, то схема представлена в таблице.
 - Если с 6–12 месяцев, то по схеме 0-1,5-12.
 - Если после 12 месяцев, то прививают однократно.
- Начиная с 1 года по схеме 1–7 месяцев с последующей однократной ревакцинацией через 1 год и последующими 1 раз в 3 года.
- В 9–15 лет схема вакцинации: 0-6 месяцев (представлена в таблице).
 - С 15 до 45 лет (женщинам) и с 15 до 26 (мужчинам) рекомендована схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины. Схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины: 0-2-6 месяцев. При необходимости изменения графика вакцинации вторая доза может быть введена через 1–2,5 месяца после введения первой дозы, а третья доза — через 5–12 месяцев после введения первой дозы.
- С 9 месяцев до 23 месяцев по схеме 0-3, с 2 до 55 лет — однократно.
- Существует плановая и экстренная профилактика (если был контакт с больным). Плановая: двукратно с интервалом не менее 6 недель. Экстренная: однократно 1 доза в течение 96 часов после контакта.