

Объединенный календарь вакцинации: для детей и взрослых



	Дети до 18 лет																					Взрослые					
	Месяцы												Годы									Годы					
	0	1	2	3	4.5	6	8 32 недели	9	12	15	18	20	2	3	4	5	6	7	12	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+	
Туберкулез	V1 3–7 дн. БЦЖ-м																RV БЦЖ										
Гепатит В	V1	V2				V3																					
	V1	V2	V3					V4																			
Пневмококковая инфекция¹			V1	V2	V3					RV																	
			V1		V2					RV																	
Коклюш				V1	V2	V3					RV1						RV2			RV3		Каждые 10 лет с момента последней вакцинации					
Дифтерия				V1	V2	V3					RV1						RV2			RV3		Каждые 10 лет с момента последней вакцинации					
Столбняк				V1	V2	V3					RV1						RV2			RV3		Каждые 10 лет с момента последней вакцинации					
Полиомиелит²				V1	V2	V3					RV1	RV2					RV3										
Гемофильная инфекция³				V1	V2	V3					RV																
Корь									V1								V2										
Краснуха									V1								V2			Только женщины, мужчины до 18 лет							
Эпидемический паротит									V1								V2										
Грипп							Ежегодно																				
Клещевой энцефалит⁴							V1, V2, RV																				
Гепатит А							2 дозы*																				
Папилломавирусная инфекция⁵																		V1 и V2 (9–13 лет)									
Вакцина менингококковая четырёхвалентная⁶							V1*																				
Ветряная оспа⁷							2 дозы*																				
Ротавирусная инфекция			V1 6–12 нед.	V2, V3 каждая через 4–10 нед. V3 не позднее 32 нед.																							
Коронавирусная инфекция																				V1 и V2 с интервалом в 21 день							

Также в рамках Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусмотрена вакцинопрофилактика туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, Ку-лихорадки, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, шигеллезов, ротавируса

Объединенный календарь вакцинации: для детей и взрослых

Национальный календарь	
	Все лица данной возрастной группы
	Лица из групп риска, по показаниям, призывники
	Ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений и однократно привитые (для кори и краснухи)
V1, V2, V3	Порядковый номер вакцинации
RV	Ревакцинация
ИПВ	Инактивированная полиомиелитная вакцина
ОПВ	Оральная полиомиелитная вакцина
По эпидемическим показаниям	
	Лица, проживающие на эндемичных территориях; лица, выезжающие на эндемичные территории; лица, подверженные профессиональному риску заражения
	Лица в очагах инфекции, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу
	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических и прививках
	Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые
	Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами
*	Схема согласно действующим инструкциям по медицинскому применению препарата
**	Возраст начала вакцинации и схема введения в зависимости от выбранного препарата
Региональная программа СПб «Борьба с онкологическими заболеваниями», 2019–2024 годы	
	Все лица данной возрастной группы

- ¹ - Если вакцинация начинается в 2–6 месяцев, то индивидуальная иммунизация проходит по схеме 3+1, массовая иммунизация — по схеме 2+1 (представлена в таблице).
 - Если вакцинация начинается в 7–11 месяцев, то иммунизация проходит по схеме 2+1: 2 дозы с интервалом не менее 4 недель между введениями. Ревакцинация однократно в 2 года.
 - Если вакцинация начинается в 12–23 месяца, то иммунизация проходит по схеме 1+1: 2 дозы с интервалом не менее 8 недель между введениями.
 - Если вакцинация начинается в 2 года или старше, то иммунизация проходит однократно.
- ² V1-V3 и RV1 независимо от возраста проводятся только ИПВ, RV2 и RV3 — как ОПВ, так и ИПВ.
- ³ - Если ребенка начали прививать до 6 месяцев, то схема представлена в таблице.
 - Если с 6–12 месяцев, то по схеме 0-1,5-12.
 - Если после 12 месяцев, то прививают однократно.
- ⁴ Начиная с 1 года по схеме 1–7 месяцев с последующей однократной ревакцинацией через 1 год и последующими 1 раз в 3 года.
- ⁵ - В 9–13 лет включительно схема вакцинации: 0-6 месяцев (представлена в таблице).
 - С 15 до 45 лет (женщинам) и с 15 до 26 (мужчинам) рекомендована схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины. Схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины: 0-2-6 месяцев. При необходимости изменения графика вакцинации вторая доза может быть введена через 1–2,5 месяца после введения первой дозы, а третья доза — через 5–12 месяцев после введения первой дозы.
- ⁶ С 9 месяцев до 23 месяцев по схеме 0-3, с 2 до 55 лет — однократно.
- ⁷ Существует плановая и экстренная профилактика (если был контакт с больным). Плановая: двукратно с интервалом не менее 6 недель. Экстренная: однократно 1 доза в течение 96 часов после контакта.